

APICOLTURA

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA aggiornata al 01.04.2016 p.1

	APILIFE VAR® AIC n.103132015 Chemicals Laif spa Striscia per arnia per api	APIGUARD® AIC n.103567018 Vita (Europe) Limited Gel per uso negli alveari	THYMOVAR® AIC n.103879019 Andermatt BioVet AG Striscia per alveari
Principio attivo	Timolo 8 g, levomentolo 0,39 g, eucalipto olio 1,72 g, canfora racemica 0,39 g/striscia	Timolo 12,5 g/vaschetta	Timolo 15 g/striscia
Indicazioni	Trattamento della varroasi causata da <i>Varroa destructor</i> in <i>APIS MELLIFERA</i>		
Periodo di trattamento	Fine estate, dopo il raccolto del miele, quando la covata è diminuita. Intervenire dopo aver tolto i melari. Non utilizzare durante la produzione di miele per evitare di alterarne il gusto.	Fine estate, immediatamente dopo la rimozione dei melari e con covata in fase decrescente. Utilizzabile anche in primavera con temperatura non inferiore a 15°C. Non trattare durante il flusso nettario per evitare di alterare il sapore del miele.	Periodo estivo, subito dopo le smielature. Intervenire dopo aver tolto i melari e chiuso le pareti a maglia Non trattare durante la produzione di miele (flusso nettario).
Tempo (i) di attesa	Miele: zero giorni		
Temperatura esterna	Temperatura ideale 20-25°C. Non utilizzare quando la temperatura massima giornaliera è superiore a 30°C. Efficacia ridotta sotto 15°C.	Non utilizzare oltre i 40°C di temperatura massima diurna. Non utilizzare sotto 15°C o quanto l'attività della colonia è molto bassa.	Migliore efficacia a t° massima diurna tra 20-25°C. Non usare in caso di temperatura massima giornaliera sup. a 30°C. Sotto 15°C ci si può attendere un'efficacia insufficiente.
Dosaggio	1 striscia ogni 7 gg per arnia, ripetere per 4 volte. Trattamento completo: 4 strisce/arnia/1 volta all'anno	1 vaschetta/alveare per 2 volte con intervallo di due settimane. Massimo due trattamenti l'anno. Non conservarlo oltre 30°C e proteggerlo dalla luce solare.	3 mezze strisce per arnia utilizzando le forbici. Rimuovere le strisce esaurite dopo 3-4 settimane e sostituirle con delle nuove, per altrettanto periodo di tempo. Poi rimuoverle.
Somministrazione	Posizionare la striscia in uno dei 4 angoli sopra il nido, lontano dalla covata. Richiudere l'arnia e lasciare agire per 7gg. La str. può essere usata anche spezzata in 3-4 pezzi da porre agli angoli dell'arnia, lontano dalla covata. Non utilizzare con altri farmaci acaricidi contemporaneamente. Rimuovere i residui alla fine del trattamento.	Porre la vaschetta aperta al centro sopra i favi con il gel rivolto verso l'alto. Assicurarsi che ci sia uno spazio libero di almeno 0,5 cm sopra la vaschetta e il coprifavo. Chiudere l'arnia. Sostituirla dopo 14 gg con altra nuova. Lasciarla in sito sino al suo svuotamento. Rimuoverla alla posa dei melari.	Posizionare 3 mezze strisce sui listelli dei telaini a formare un triangolo che circoscriva l'area della covata (distanza consigliata 4 cm dalla covata). Accertarsi che ci sia una distanza minima di 5 mm tra le strisce e il coprifavo. Per un controllo ottimale mantenere adeguate concentrazioni di vapori di timolo per 6-8 settimane consecutive.
Precauzioni	Trattare simultaneamente tutte le arnie dello stesso apiario per evitare il saccheggio. Utilizzare in un piano integrato di lotta. Verificare l'efficacia del trattamento.		
	Sconsigliato l'utilizzo in arnie a cassa multipla. Effettuare i trattamenti in assenza di melario. Non è consigliato trattare le arnie quando fa freddo. Proteggere le strisce dal gelo.	Non utilizzare quando l'attività della colonia è molto bassa o su famiglie deboli. Riunire le colonie deboli prima del trattamento. Non estrarre i favi trattati dalla camera di covata sino alla primavera successiva. Non congelare.	Non utilizzare in caso di temperature medie superiori a 30°C. Non estrarre i favi di covata trattati sino alla primavera successiva. Proteggere le strisce dal gelo.
Reazioni avverse	Se la temperatura esterna è superiore a 30°C può aumentare lo stress e mortalità delle api adulte e della covata. Sovradosaggio: fuoriuscita delle api dall'arnia. Possibilità che le api spostino il cibo posto sotto la striscia. Possibile riduzione dell'accettazione del nutrimento.	Lieve agitazione della colonia durante il trattamento. A temperatura elevata si può osservare una lieve e transitoria riduzione della covata. Se si verifica rimozione di covata disopercolata in prossimità della vaschetta, rimuovere il prodotto.	L'utilizzo in caso di temperature medie superiori ai 30°C può determinare leggera agitazione nella colonia e provocare un moderato aumento della mortalità della covata e delle api. Riduzione dell'accettazione del nutrimento se la nutrizione coincide col trattamento.
Avvertenze	Evitare l'inalazione, l'ingestione ed il contatto con la pelle.	Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non inalare.	Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
Distributore per l'Italia	CHEMICALS LAIF spa - Vigonza (PD) - Tel. 049 626281 e-mail: info@chemicalslaif.it	VITA- ITALIA Verona Tel. 045 8104150 vitaitalia@vitaitalia.191.it	FILOOZOO srl -41012 CARPI (MO) Tel. 059-637311 efurculita@filoozoo.com
Confezione	Sacchetto contenente 2 strisce	Scatola da 10 vasc. da 50 g	Busta contenente 10 strisce
Ricetta	La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria. Consigliato conservare il documento di acquisto e registrare il Lotto del prodotto acquistato		
Apicoltura Biologica	Sì		
Costo indicativo compr.IVA 10%	Sacc. con 2 str. € 2,20 -2,80 costo tratt./alv. 4,40-5,60 €	Conf.da 10 vasc. € 23,00-28,00 costo tratt./alv. 4,60-5,60 €	Conf. da 10 strisce € 21,45-24,00 costo tratt./alv. 6,44-8,00 €

APICOLTURA

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA **aggiornata al 01.04.2016** p.2

	APIVAR 500 mg[®] <small>AIC n.102481013</small> Laboratoire BIOVE Strisce per alveare per api	APITRAZ 500 mg[®] <small>AIC n.104930019</small> Laboratorios CALIER S.A. Striscia per alveari per api
Principio attivo	Amitraz 500 mg (°°)	Amitraz 500 mg (°°)
Indicazioni	Trattamento della varroasi causata da <i>Varroa destructor</i> e <i>Varroa jacobson</i> in APIS MELLIFERA	Trattamento di parassitosi esterna causata da <i>Varroa destructor</i> sensibile all'Amitraz in APIS MELLIFERA
Periodo di trattamento	Disporre le strisce entro le arnie in autunno o primavera a seconda del grado di infestazione. In primavera prima del flusso nettario, in autunno dopo la rimozione dei melari.	Il prodotto deve essere usato quando la quantità di covata è bassa e quando le api sono ancora attive, cioè prima che formino il glomere.
Tempo (i) di attesa	Miele: zero giorni	
	Si raccomanda di non trattare gli alveari in presenza di melari.	Non usare durante la raccolta del miele. Non usare prima della fine della stagione di raccolta del miele. Non raccogliere il miele durante le 6 sett. di trattamento.
Temperatura esterna	Nessuna indicazione d'uso	
Dosaggio	Due strisce per alveare su 10 telaini. Ripetere il trattamento alla fine dell'estate e ad ogni primavera. Trattare contemporaneamente tutte le colonie di un apiario per evitare reinfestazioni.	Usare due strisce per alveare. Le strisce devono essere rimosse dopo 6 settimane. Non dividere le strisce. Non riutilizzarle
Somministrazione	Separare la doppia striscia e disporre ogni striscia tra due telai mobili, a distanza di almeno 2 telai. Lasciare le strisce in loco per 42 gg. Non oltre 56 gg. Le strisce non sono riutilizzabili. Smaltirle secondo le norme di legge.	Appendere ogni striscia tra due favi di scorte di miele ove le api mostrano la maggiore attività di passaggio, mantenendo lo spazio d'ape ad entrambe le facciate. Arnie Dadant: tra 3° e 4° favo e 7° e 8°. Arnie Layens: tra 5° e 6° favo e 9° e 10°. Tutte le colonie dell'apiario devono essere trattate simultaneamente per evitare il saccheggio.
Precauzioni	Non ingerire ed evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Indossare guanti protettivi. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Non disperdere le strisce o i sacchetti vuoti in corsi d'acqua. Non utilizzare in presenza di sali di rame e di Piperonil butossido.	Amitraz è inibitore dell'enzima monoaminoossidasi. Non inalare. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non disperdere le strisce o i sacchetti vuoti in corsi d'acqua. Gestire il rifiuto nei sistemi di raccolta e smaltimento per medicinali scaduti. Non utilizzare in presenza di sali di rame e di Piperonil butossido.
Reazioni avverse	Farmaco-resistenza. Efficacia discontinua. Per reazioni avverse gravi o reazioni non menzionate in etichetta si prega di informare il veterinario.	Nelle api sono stati registrati casi di resistenza all'amitraz. In paesi con riconosciuta resistenza all'amitraz, l'uso del prodotto deve basarsi sui test di sensibilità. Rivolgersi al veterinario per ulteriori informazioni. Non usare in caso di resistenza riconosciuta all'amitraz. Il profilo di sicurezza del prodotto non è stato valutato nelle colonie deboli.
Avvertenze	Indossare i guanti ed evitare di bere, mangiare e fumare durante la manipolazione delle strisce. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non conservare a t° > di 25°C	Indossare dispositivi di protezione (guanti impermeabili). Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non conservare a t° > di 25°C
Distributore per l'Italia	FILOZOO srl – Viale del Commercio, 28-30 41012 CARPI (MO) Tel. 059-637311 e-mail: efurculita@filozoo.com	CHEMICALS LAIF spa - Vigonza (PD) – Tel. 049 626281 e-mail: info@chemicalslaif.it
Confezione	Confezione da 10 strisce	Confezione da 10 strisce
Ricetta	La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria. Consigliato conservare il documento di acquisto e registrare il n° di Lotto	
Apicoltura Biologica	No	
Costo indicativo compr.IVA 10%	Sacchetto da 10 strisce € 29,15-33,00 costo tratt./alv. 5,83 – 6,60 €	Sacchetto da 10 strisce € 30 -32; costo tratt./alv. 6,00-6,40 €

(°°) Maggi D.M., Ruffinengo S.R., Negri P., Eguares M.J. - Resistance phenomena to amitraz from populations of the ectoparasitic mite *Varroa destructor* of Argentina – Parasitol Res (2010)107:1189 -1192

APICOLTURA

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA aggiornata al 01.04.2016 p.3

	<p style="text-align: center;">API-BIOXAL 886mg/g[®] A.I.C. n. 104384019(35g) - 104384021 (175g) – 104384033 (350g) Chemicals Laif spa Polvere solubile per api</p>
Principio attivo	Ac. Ossalico biidrato 886 mg/g
Indicazioni	Trattamento della varroasi causata da <i>Varroa destructor</i> in <i>APIS MELLIFERA</i>
Periodo di trattamento	Utilizzare il medicinale soltanto in periodi in cui vi è una diminuzione o assenza di covata, oppure in seguito ad un blocco di covata indotto in modo artificiale. La presenza di covata può ridurre sensibilmente l'efficacia del prodotto.
Tempo di attesa	Miele: zero giorni
Temperatura esterna	Nessuna indicazione
Dosaggio, preparazione e somministrazione	<p>Sciogliere il contenuto di una busta nella corretta quantità di sciroppo. Lo sciroppo si ottiene miscelando acqua e saccarosio (comune zucchero da cucina) in parti uguali (1:1).</p> <p>Per gocciolamento: 5ml di sciroppo medicato/favo occupato dalle api, in un'unica somministrazione (dose massima 50 ml/alveare), gocciolando con una siringa la soluzione sui favi, trasversalmente alla loro direzione.</p> <p>Per sublimazione: utilizzare un apparecchio a resistenza elettrica. Versare 2,3 g di APIBIOXAL nell'apparecchio spento. Introdurre l'apparecchio profondamente attraverso l'apertura di volo, evitando il contatto coi favi. Sigillare per evitare la fuoriuscita delle api e dei fumi. Alimentare l'apparecchio seguendo le istruzioni del produttore per 3 minuti e ripristinare l'apertura di volo non prima di 10 minuti. Dopo ogni utilizzo raffreddare e ripulire l'apparecchio da ogni residuo con acqua potabile.</p>
Precauzioni	<p>Utilizzare il prodotto in assenza di melario. Trattare simultaneamente tutti gli alveari di un apiario per evitare re infestazioni. Evitare manipolazioni della colonia nei giorni successivi al trattamento.</p> <p>Conservare la polvere nella confezione originale ben chiusa in luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Non congelare e non refrigerare. Dopo la prima apertura della confezione, tutta la polvere deve essere usata entro i 3 mesi successivi.</p> <p>Preparare di volta in volta la giusta quantità di soluzione occorrente per il trattamento col gocciolato.</p> <p>Non ingerire, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, non inalare. Maneggiare il prodotto in polvere (sia durante il trattamento per sublimazione che nelle fasi pre-trattamento) indossando la maschera protettiva tipo FFP2, guanti ed occhiali protettivi.</p>
Reazioni avverse Sovradosaggio	<p>La colonia può agitarsi durante il trattamento. Nonostante il trattamento, colonie gravemente compromesse potrebbero non riprendersi dai danni provocati dall'infestazione.</p> <p>Ogni effetto indesiderato va segnalato al veterinario.</p> <p>Sovradosaggi possono disturbare il successivo sviluppo delle colonie con calo della popolazione adulta degli alveari.</p>
Avvertenze	<p>Non usare contemporaneamente con altri farmaci acaricidi.</p> <p>Non miscelare con altri farmaci veterinari.</p> <p><i>N.B. L'utilizzo per sublimazione, è meno efficace che per gocciolamento e più pericoloso per l'operatore/veterinario. I microcristalli di ossalico prodotti dalla sublimazione permangono dentro l'arnia anche a distanza di tempo dal trattamento. L'operatore/il veterinario dovranno quindi proteggersi sempre con maschera protettiva tipo FFP2, guanti, occhiali, durante le visite successive per evitare di inalare i microcristalli di acido ossalico dannosi per la mucosa respiratoria. L'inalazione dei microcristalli può avvenire in concomitanza anche soltanto del controllo del fondo dell'arnia.</i></p>
Distributore per l'Italia	Chemicals Laif spa - Via dell'Artigianato,13 - 35010 Vigonza (PD) 049 - 626281 - info@chemicalslaif.it
Confezione	<p>Busta da 35 g per 10 alveari da sciogliere in 0,5 litri di sciroppo Busta da 175 g per 50 alveari " " " 2,5 litri " " Busta da 350 g per 100 alveari " " " 5,0 litri " "</p> <p>Il numero di alveari per busta è stato calcolato considerando 10 telaini occupati da api e con il metodo di somministrazione per gocciolamento.</p>
Ricetta	La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria. Consigliato conservare il documento di acquisto. Consigliato registrare il n° di Lotto del prodotto acquistato
Apicoltura Biologica	Sì
Costo indicativo compr. IVA 10%	<p>Busta 35 g per 10 alveari € 10,50-13,00 costo tratt./alv. 1,05-1,30 € Busta 175 g per 50 alveari € 45,80-48,00 costo tratt./alv. 0,91-0,96 € Busta 350 g per 100 alveari € 74,40-80,00 costo tratt./alv. 0,74-0,80 €</p>

In corsivo avvertenze per la salute dell'Operatore/Veterinario a cura della FNOVI

APICOLTURA

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA aggiornata al 01.04.2016

p.4

	<p>MAQS 68,2 g[®] A.I.C. n.104726017-29-31-43</p> <p>Nod Europe Ltd. Strisce per alveare</p>
Principio attivo	Acido formico 68,2 g/striscia
Indicazioni	Trattamento della varroasi causata da <i>Varroa destructor</i> in <i>APIS MELLIFERA</i>
Periodo di trattamento	<p>Il prodotto deve essere usato solo nell'ambito di un programma integrato di controllo della varroa, su nido singolo o doppio di arnie Langstroth standard o equivalenti con almeno 6 telaini del nido, coperti di api (circa 10.000 api). Quando la temperatura diurna è intorno a 25°C.</p> <p>Le strisce possono essere utilizzate durante l'importazione nettarifera. Mettere in posa i melari, se si prevede un'importazione nettarifera anticipata, per garantire adeguato spazio alla colonia.</p>
Tempi di attesa	<p>Miele: zero giorni</p> <p>Non raccogliere il miele durante i 7 giorni di trattamento. L'acido formico non è lipofilo pertanto non lascia residui nel favo.</p>
Temperatura esterna	Il giorno del trattamento la temperatura esterna diurna massima deve essere compresa tra 10-29.5°C. Per garantire un'efficacia sufficiente, il prodotto deve essere usato quando la t° esterna supera i 10°C.
Dosaggio	2 strisce per arnia per 7 gg. Attendere almeno 1 mese prima di ripetere l'applicazione. Trattare tutte le colonie dell'apiario simultaneamente. Uso all'interno dell'arnia.
Somministrazione	<p>Posizionare 2 strisce per arnia (il contenuto di 1 bustina). Estrarre con cautela le due strisce dalla bustina. Sollevare l'involucro in modo che la plastica si stacchi dalle strisce e tagliare l'involucro per l'intera lunghezza della bustina. Separare le strisce con cautela.</p> <p>NON RIMUOVERE GLI INVOLUCRI DI CARTA.</p> <p>Nel caso di alveari con singolo nido, adagiare le due strisce sopra i montanti dei favi della camera di covata, posizionandole in modo che siano adagiate piatte lungo l'intera lunghezza del corpo dell'arnia a circa 5 cm di distanza l'una dall'altra e con i bordi delle strisce a 10 cm di distanza dal bordo della camera di covata.</p> <p>Nel caso di arnie con due camere di covata, collocare le strisce come descritto sopra, sui montanti dei favi della camera di covata inferiore, in modo che le strisce si trovino tra le due camere di covata.</p> <p>Effettuare la posa dei melari se necessario, per fornire spazio sufficiente per l'espansione di colonie forti o se si prevede l'importazione nettarifera. E' possibile usare l'escludi-regina.</p> <p>Gli ingredienti/eccipienti principali della formulazione sono zucchero e amido alimentare con un involucro di carta biodegradabile/compostabile. Non è necessario rimuovere le strisce dall'arnia dopo l'applicazione. Se le strisce vengono rimosse dall'operatore smaltirle mediante compostaggio.</p>
Precauzioni	<p>Monitorare le colonie di api regolarmente, per determinare il livello di infestazione da varroa.</p> <p>Non disturbare la colonia per 7 giorni.</p> <p>Le colonie necessitano di adeguata ventilazione durante il trattamento: deve essere garantita un'apertura pari all'intera lunghezza dell'arnia per i 7 gg di trattamento (la porticina d'ingresso deve rimanere completamente aperta ed avere altezza minima di 1,3 cm).</p> <p>Le colonie devono avere buone scorte alimentari e non devono essere alimentate durante il trattamento.</p> <p>Non distruggere le celle reali che si potrebbero osservare prima o dopo il trattamento.</p> <p>Verificare che nella colonia sia presente la regina un mese dopo il trattamento. Non è raro che dopo il trattamento siano presenti contemporaneamente sia la regina madre che la figlia.</p> <p>Per l'operatore: evitare il contatto con la pelle indossando guanti resistenti alle sostanze chimiche (EN374). Avere acqua immediatamente disponibile. In caso di contatto lavare immediatamente la pelle esposta con acqua e rivolgersi ad un medico se l'irritazione persiste. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e rivolgersi ad un medico mostrando l'etichetta.</p> <p>Evitare l'inalazione dei vapori. Aprire la confezione solo all'aperto, nella direzione del vento. In caso di inalazione accidentale spostare l'infortunato all'aria aperta e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste. Non mangiare, bere o fumare durante la somministrazione.</p> <p>Lavarsi bene le mani con acqua e sapone immediatamente dopo l'applicazione.</p> <p>Tenere i bambini a debita distanza durante l'applicazione del prodotto.</p>
Effetti Indesiderati	L'acido formico disturberà le attività della colonia e potrebbe esitare nel rifiuto della regina o comportare un lieve aumento della mortalità delle api adulte e della covata (fasi iniziali del trattamento). Temperature superiori a 29.5°C nei primi 3 giorni di trattamento possono provocare un'eccessiva mortalità della covata e la perdita dell'ape regina. Se tali temperature coincidono con un periodo di scarso raccolto esiste un alto rischio di perdita della regina, sua sostituzione o ritardo nell'ovo-deposizione.
Sovradosaggio	<p>Il trattamento deve essere rinviato quando la temperatura scende sotto i 10°C o riprende il flusso nettarifero.</p> <p>E' previsto che la colonia possa aumentare il numero dei telaini occupati, per ventilare i vapori di prodotto, durante i primi 3 gg di trattamento. Si può osservare la formazione di "barba".</p> <p>Il sovradosaggio provoca un'eccessiva perdita di covata e di api adulte, morte della regina, sciamatura.</p> <p>Procedura di emergenza: aumentare l'areazione dell'arnia con porticine supplementari dall'alto verso il basso. Verificare la presenza di regina 2 sett. dopo il trattamento.</p>
Controindicazioni e reazioni avverse	<p>Non usare contemporaneamente ad altri acaricidi contro la varroasi.</p> <p>Non usare a temperatura fuori dell'intervallo tra 10 e 29.5 °C.</p> <p>Non usare per il trattamento di colonie più piccole di quelle indicate.</p> <p>L'Ac. formico può disturbare in un primo momento le attività della colonia. Entro il primo giorno dall'applicazione la regina potrebbe essere rifiutata e potrebbe aumentare la mortalità delle api adulte e della covata. Dopo il periodo di trattamento la colonia tornerà alla normalità.</p> <p>La colonia può morire se trattata a temperatura > di 37 °C.</p>

APICOLTURA

	Comunicare le reazioni avverse al medico veterinario.
Avvertenze	<p>Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>Conservare a t° inferiore di 25°C; proteggere dalla luce solare diretta; conservare in luogo asciutto; mantenere la vaschetta di polipropilene ermeticamente chiusa; conservare il prodotto nel contenitore originale ermeticamente chiuso, in un'area ben ventilata, lontano da acido solforico, agenti ossidanti forti (ac. nitrico, perossidi, perclorati, cloriti) e fonti di ignizione.</p> <p>Periodo di validità dopo la prima apertura della bustina: usare immediatamente.</p> <p>Il prodotto è corrosivo: non lasciare che il prodotto venga a contatto con superfici di metallo.</p>
Distributore per l'Italia	FILOZOO srl – Viale del Commercio , 28-30 41012 CARPI (MO) Tel. 059-637311 e-mail: efurculita@filozoo.com
Confezione	Confezioni da 4, 6, 10, 20 strips (da 2, 3, 5, 10 dosi unitarie)
Ricetta	<p>La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.</p> <p>Consigliato conservare il documento di acquisto.</p> <p>Consigliato registrare il n° di Lotto del prodotto acquistato</p>
Apicoltura Biologica	Sì
Costo indicativo compr. IVA 10%	Confezione da 20 strips € 57,00 - 64,90 costo tratt./alv. 5,70-6,49 €

Attenzione

REAZIONI AVVERSE - Per legge le reazioni avverse prevedono una segnalazione di farmacovigilanza. "Reazione avversa" è anche mancata efficacia. E' bene che ogni reazione avversa che l'apicoltore osservi a seguito della somministrazione di un farmaco, sia segnalata anche al medico veterinario. Le modalità di segnalazione sono indicate nel sito del Ministero della Salute:

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=FMV&idSrv=PSK&flag=P

SMALTIMENTO - Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge.

SCORTA - La detenzione di scorte di farmaci nell'azienda apistica è consentita solo dietro autorizzazione della usl. Ne è responsabile un medico veterinario che la custodisce in idonei locali chiusi ubicati presso l'azienda e tiene apposito registro di carico e scarico da conservarsi per 5 anni dall'ultima registrazione. Qualunque medicinale, anche quello per cui non c'è l'obbligo di prescrizione con ricetta, se approvvigionato per scorta, richiede la RNRTC (Ricetta Non Ripetibile in Triplice Copia).

APICOLTURA

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA aggiornata al 01.04.2016 p.6

	VARTERMINATOR 360mg/g[®] A.I.C. n. 104736018 IZO s.r.l. Tavoletta in gel per api
Principio attivo	Acido formico 360 mg/g
Forma farmaceutica	Tavoletta in gel trasparente e privo di residui di polvere indisciolta, contenuta in un sacchetto di tessuto non tessuto di colore biancastro
Indicazioni	Trattamento delle api (<i>Apis mellifera</i>) affette da infestazione da <i>Varroa destructor</i>
Tempi di attesa	Miele: zero giorni
Temperatura esterna	È consigliato il trattamento con temperature medie giornaliere comprese tra i 15 °C e i 35 °C.
Dosaggio	Applicare due tavolette da 250 g e sostituirle con altre 2 dopo 10 giorni. Il trattamento può essere ripetuto durante l'anno; si sconsigliano trattamenti ravvicinati.
Metodo di somministrazione	Aprire l'arnia, rimuovere il film di copertura della vaschetta, rovesciare i due sacchetti contenente il gel sulla parte superiore dei telaini. Richiudere l'arnia con il coprifavo rovesciato al fine di garantire un adeguato volume d'aria tra il gel e il coperchio. Applicare il cassetto del fondo antivarroa per evitare la dispersione dei vapori di acido formico; la porticina d'ingresso deve rimanere completamente aperta per garantire adeguata ventilazione durante il trattamento. Non sottoporre a trattamento alveari deboli (< 10.000 api) e/o in situazioni in cui vi è una compromissione della normale importazione nettariifera.
Precauzioni	Non utilizzare forbici o lame per aprire la vaschetta; evitare il contatto diretto della tavoletta di gel con superfici metalliche. Per l'operatore: evitare il contatto con occhi e con la pelle indossando guanti resistenti alle sostanze chimiche (EN374), non guanti di pelle. Avere acqua immediatamente disponibile. In caso di contatto lavare immediatamente la pelle esposta con acqua e rivolgersi ad un medico se l'irritazione persiste. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e rivolgersi ad un medico mostrando l'etichetta. Evitare l'inalazione dei vapori. Aprire la confezione solo all'aperto, nella direzione del vento. In caso di inalazione accidentale spostare l'infortunato all'aria aperta e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste. Non mangiare, bere o fumare durante la somministrazione. Lavarsi bene le mani con acqua e sapone immediatamente dopo l'applicazione. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini
Effetti Indesiderati	La colonia può agitarsi durante il trattamento. Tossicità nelle uova che vengono rimosse e sostituite.
Sovradosaggio	Si sconsiglia la somministrazione di due cicli completi consecutivi. Ogni effetto indesiderato va segnalato al veterinario.
Precauzioni per la conservazione	Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non conservare a t°C > ai 30°C, Conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce, in aree ventilate, lontano da acido solforico, agenti ossidanti, fonti di calore, fonti di ignizione.
Avvertenze	Non usare contemporaneamente con altri farmaci acaricidi.
Produttore	IZO srl - Via San Zeno,99/A - 25124 Brescia 030 - 2420583 - izo@izo.it
Confezione	Confezione da 2 tavolette da 250 g (1 dose unitaria)
Ricetta	Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione medico veterinaria. La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie. Consigliato conservare il documento di acquisto. Consigliato registrare il n° di Lotto del prodotto acquistato
Apicoltura Biologica	Sì
Costo indicativo compr. IVA 10%	Confezione da 2 tavolette € 4.95 costo tratt./alv. 9,90 €

APICOLTURA

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA aggiornata al 01.04.2016 p.7

	APISTAN 800 mg[®] AIC n. 103222016 Vita (Europe) Limited Striscia per alveare per api Tau-fluvalinato 800 mg (*)
Principio attivo	Tau-fluvalinato 800 mg (*)
Indicazioni	Trattamento della varroasi causata da <i>Varroa destructor</i> in <i>APIS MELLIFERA</i>
Periodo di trattamento	Trattare dopo l'ultima smielatura. Se usato per il trattamento estivo in presenza di covata, va considerato che il prodotto è efficace sulla varroa man mano che esce dalla covata nascente.
Tempo (i) di attesa	Miele: zero giorni
Temperatura esterna	Trattare in giornate soleggiate con temperatura massima diurna oltre 16-18°C tale per almeno una settimana (colonia in attività).
Dosaggio	2 strisce per alveare poste entro i telaini 3° e 4° e 7° e 8° mantenute non oltre 8 settimane a seconda delle condizioni ambientali e della presenza o meno di covata.
Somministrazione	Operare dopo l'ultima smielatura in assenza di melario. Inserire tra i favi. Mantenere le strisce in loco non oltre le 8 settimane. Mantenerle oltre può favorire l'avvio di eventuali processi di resistenza. Non utilizzare contemporaneamente con altri antiparassitari.
Precauzioni	Trattare simultaneamente tutte le arnie dello stesso apiario in assenza di melario e in presenza di quantità minime di covata opercolata. Non utilizzare a scopi alimentari il miele raccolto durante il trattamento. Recuperare gli acari caduti sul fondo antivarroa vaselinato.
Reazioni avverse	Farmaco-resistenza: alternare con altro specifico prodotto. Verificarne l'efficacia.
Avvertenze	Indossare i guanti ed evitare di bere, mangiare e fumare durante la manipolazione delle strisce. Non ingerire. Particolare attenzione devono fare gli allergici e gli asmatici nella manipolazione del prodotto. Conservare il prodotto a temperatura inferiore di 40 °C.
Distributore per l'Italia	VITA- ITALIA Verona Tel. 045 8104150 e-mail: vitaitalia@vitaitalia.191.it
Confezione	Sacchetto da 10 strisce
Ricetta	La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria. Consigliato conservare il documento di acquisto e registrare il n° di Lotto
Apicoltura Biologica	No
Costo indicativo compr. IVA 10%	Sacchetto da 10 strisce da 8 g € 25,00 – 28,00 costo tratt./alv. 5,00- 5,60€

(*) principio attivo che può generare farmaco-resistenza nell'acaro